

ਸੂਈ/ਸਰਿੰਜ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣਾ

ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੂਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰਿੰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁੱਟਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਫਾਰਮੇਸੀ ਜਾਂ ਡਰੱਗਸਟੋਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੂਈਆਂ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਿੰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁੱਟਣ ਬਾਰੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਜਾਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੂਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਕਲਿਨਿਕ ਵਿਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉ।

ਹੈਪੇਰਿਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਚਾਰਟ



ਹਰ ਡੋਜ਼ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈਪੇਰਿਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਯੂਨਿਟਸ

ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈਪੇਰਿਨ ਦਾ ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ: ਯੂਨਿਟਸ/ਐੱਮ ਐੱਲ

(ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹੈਪੇਰਿਨ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਦੇਖੋ)

ਸਰਿੰਜ 'ਤੇ ਇਹ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਹੈਪੇਰਿਨ ਹਰ 12 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਲੈਣੀ ਹੈ ਵਜੇ ਸਵੇ ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ

(ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਪੇਰਿਨ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਲਵੋ)

ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ: ਐਂਥੂਲੇਟਰੀ ਕਲਿਨਿਕ, ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਮਨਜ਼ ਹੋਸਪੀਟਲ

ਰੂਪਾਂਤਰ ਅਤੇ ਸੋਧਿਆ:

ਵਿਮਨਜ਼ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਐਂਥੂਲੇਟਰੀ ਕਲਿਨਿਕ, ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਮਨਜ਼ ਹੋਸਪੀਟਲ

ਚਿੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ: ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ - ਯੂ ਬੀ ਸੀ

ਸੋਧਿਆ: ਜੂਨ 2006


© 2006 BC Women's Hospital & Health Centre

BCWH#598

[Punjabi]

ਹੈਪੇਰਿਨ ਦਾ ਟੀਕਾ

HEPARIN INJECTION



4500 ਓਕ ਸਟਰੀਟ, ਵੈਨਕੂਵਰ,

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ

V6H 3N1

ਟੈਲੀਫੋਨ: (604) 875-2160

ਫੈਕਸ: (604) 875-2871

ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ

ਹੈਪੇਰਿਨ: ਦਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ.....	1
ਹੈਪੇਰਿਨ ਤਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ.....	2
ਹੈਪੇਰਿਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਵਾਰੀ.....	4
ਹੈਪੇਰਿਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ	5
ਸੂਈ/ਸਰਿੰਜ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣਾ	6
ਹੈਪੇਰਿਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਚਾਰਟ	6

ਨੋਟ:

ਹੈਪੇਰਿਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

1. ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਤੂੰਬੇ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।



2. ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਚੁੰਢੀ ਭਰੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਪੇਰਿਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੈਪੇਰਿਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸਰਿੰਜ ਲਈ: ਸਰਿੰਜ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉ ਤਾਂ ਜੋ ਹਵਾ ਇਸ ਘੋਲ ਨਾਲੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਦਮ 3 'ਤੇ ਜਾਓ।



3. ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੀ ਸੂਈ ਧੱਕੋ।



4. ਹੈਪੇਰਿਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਓ।



5. ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਸੂਈ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ।




6. ਟੀਕਾ ਲੱਗੀ ਥਾਂ ਨੂੰ 30 ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਲਈ ਪੋਲਾ ਜਿਹਾ ਦਬਾਈ ਰੱਖੋ।



7. ਸੂਈ ਅਤੇ ਸਰਿੰਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁੱਟ ਦਿਓ।

ਹੈਪੇਰਿਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਵਾਰੀ



ਹੈਪੇਰਿਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਢਿੱਡ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਥਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਥਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਰਸ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਹੈਪੇਰਿਨ: ਦਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਹੈਪੇਰਿਨ ਇਕ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਖੂਨ ਦੇ ਗੱਤਲੇ ਬਣਨ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਗਰਭ ਦੌਰਾਨ ਹੈਪੇਰਿਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ:

1. ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ (ਡੀਪ ਵੇਇਨ ਥਰੋਮਬੋਸਿਸ) ਵਿਚ ਖੂਨ ਦੇ ਗੱਤਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ (ਸਟਰੋਕ) ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਵਾਲਵ ਬਦਲੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
2. ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਐਂਟੀਬਾਡੀ (ਲਹੂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਸ਼) ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਦੇ ਗੱਤਲੇ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਭ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਲੁਪਸ ਐਂਟੀ-ਕੋਗੂਲੇਂਟ ਜਾਂ ਐਂਟੀਕਾਰਡੀਓਲੀਪਿਨ ਐਂਟੀਬਾਡੀ)।

ਹੈਪੇਰਿਨ, ਜੇਰ ਲੰਘ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਗੱਤਲੇ ਬਣਨ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਗੱਤਲੇ ਬਣਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੌਲੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਗੱਤਲੇ ਬਣਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੇਟਲਿਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਮਾਪੇਗਾ (ਉਹ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿਚ ਗੱਤਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ)।

ਮਾੜੇ ਅਸਰ

ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਪੇਰਿਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੈਪੇਰਿਨ ਨਾਲ ਆਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਟੀਕਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨੀਲ ਪੈਣੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੀਲ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਲ ਹਟ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੀਲ ਪਏ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲੇ, ਲਾਲ ਜਾਂ "ਚਾਰ ਰੰਗ" ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਵੇ ਜਾਂ ਬੁੱਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਹੈਪੇਰਿਨ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ, ਗਰਭ ਦੌਰਾਨ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹੈਪੇਰਿਨ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

ਵਿਰਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੈਪੇਰਿਨ ਤੋਂ ਅਲਰਜੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੱਫੜ ਪੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਖਾਜ ਆਵੇ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਹੈਪੇਰਿਨ ਤਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ

ਜੇ ਹੈਪੇਰਿਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸਰਿੰਜ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ: ਸਫਾ 4 'ਤੇ ਜਾਉ।


ਚੀਜ਼ਾਂ:

1. ਹੈਪੇਰਿਨ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਆਰਡਰ।
2. ਹੈਪੇਰਿਨ ਦਾ ਘੋਲ।
3. ਅਲਕੋਹਲ ਦਾ ਤੂੰਬਾ।
4. ਇਨਸੂਲਿਨ ਸਰਿੰਜ ਨਾਲ ਸੂਈ (1 ਸੀ ਸੀ ਜਾਂ 1/2 ਸੀ ਸੀ)।


ਤੁਸੀਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਸਰਿੰਜ (insulin syringe) ਰਾਹੀਂ ਹੈਪੇਰਿਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਨਸੂਲਿਨ ਸਰਿੰਜ 'ਤੇ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਇਸ ਕਿਤਾਬਚੇ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਫਾ ਦੇਖੋ)।

ਤਰੀਕਾ

1. ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਵੋ।
2. ਕਿਸੇ ਸਾਫ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੋ।
(ਮੇਜ਼, ਕਿਚਨ ਜਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿਚ ਕਾਊਂਟਰਟੋਪ)।



3. ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਦੇ ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਤੂੰਬੇ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰੋ।



4. ਸਰਿੰਜ ਦੇ ਪਲੰਜਰ ਨੂੰ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈਪੇਰਿਨ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚੋ। ਇਸ ਨਾਲ "ਹਵਾ ਦੀ ਡੋਜ਼" ਸਰਿੰਜ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।




5. ਸਰਿੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਹਵਾ ਹੈਪੇਰਿਨ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਵਿਚ ਭਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੈਪੇਰਿਨ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।



6. ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਲੰਜਰ ਨੂੰ ਇਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਕਰੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਿੰਜ ਵਿਚਲੇ ਹਵਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।



7. ਪਲੰਜਰ ਨੂੰ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈਪੇਰਿਨ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚੋ। ਸੂਈ ਅਤੇ ਸਰਿੰਜ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ।



8. ਅਗਲੇ ਸਫੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਚਾਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਚੁਣੋ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਥਾਂ ਬਦਲੋ।
9. ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈਪੇਰਿਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਉ।