



# 静脉注射芬太尼须知

## Information About Intravenous Fentanyl

芬太尼是通过静脉注射输入的强阿片类药物。它可以缓解中等程度的疼痛。芬太尼可减轻您的疼痛，而没有硬膜外麻醉带来的麻木，但是，它不会消除所有疼痛。如果您的产程较长或生产困难，芬太尼缓解疼痛则不那么有效。芬太尼不会增加辅助分娩（例如使用产钳）或剖宫产的机会。在分娩过程中由医护人员为您开具处方的芬太尼不会令您上瘾或使用过量。

### 如何给药? How is it given?

在分娩过程中，芬太尼是按照对您和宝宝都安全的方式注射的。可以使用两种方法给药：

1. 医护人员可以在您的手部或手臂上通过静脉注射（IV）来输注芬太尼
2. 您也可以使用“患者自控镇痛”（PCA）来自行给药。PCA 允许您控制芬太尼每小时的给药剂量，从而达到镇痛的效果。由于 PCA 已经预设了特定时间间隔内仅允许输注安全剂量的芬太尼，因此您不会过多给药。

### 芬太尼对您的副作用 Side effects of Fentanyl for you

- 您可能会感到困倦和放松
- 您的呼吸可能会减慢；可能需要吸氧并接受监测
- 您可能会感到胃部不适
- 您可能会有瘙痒的感觉

### 芬太尼对宝宝的副作用 Side effects of Fentanyl for your baby

芬太尼通过胎盘进入婴儿体内。

- 宝宝出生时可能困倦，呼吸不好
- 宝宝出生时心率可能较低
- 如果您在分娩时服用了大量芬太尼，则可能需要在分娩后的数小时内对宝宝的呼吸进行监测。
- 宝宝可能因为困倦而无法开始吸吮母乳。您可能需要护士或哺乳顾问的帮助才能使宝宝吸吮母乳

### 了解更多信息 For more information

请问一问您的医护人员，看看您是否可以与麻醉师谈谈。