

甚麼是Synagis®？

Synagis®是一種藥物，專門幫助兒童身體抵抗一種名為呼吸道合胞病毒（簡稱合胞病毒）的嚴重病毒。在合胞病毒高峰期間，兒童每個月接受這種藥物一次，為期3至5個月。卑詩省的合胞病毒高峰期為十一月至四月。

為何我的子女需要接受Synagis®？

你的子女有較大機會出現嚴重的呼吸道合胞病毒感染。你的子女需要接受Synagis®，是出於醫生的指示。

Synagis®如何服用？

Synagis®以針筒注射在大腿上。如果你的子女需要的Synagis®劑量多於1 ml（毫升），藥物會分成兩份，分別注射在兩邊大腿上。

Synagis®是否類似子女接受的其他免疫注射？

不是。現在並無疫苗預防合胞病毒。Synagis®是一種抗體，功能類似兒童抵抗感染時天然製造的抗體。Synagis®的抗體可幫助兒童抵抗病毒約一個月。

Synagis®是血液產品嗎？

不是。你的子女不會因接受Synagis®而受感染。

我的子女需要在整個高峰期每月接受一次注射嗎？

是！你的子女接受所有注射是很重要的。每次注射能保障小孩在約為30天內不至感染嚴重的呼吸道合胞病毒。在合胞病毒高峰期間，你必須帶小孩每個月接受注射。如果你未能按時赴約，請盡快聯絡診所重新預約時間。

Synagis®有甚麼副作用？

Synagis®的副作用很少。如果有，一般也很輕微，而且不會持續長久。副作用或包括：

- 輕微發燒
- 出疹
- 注射部位發紅和疼痛。

嚴重的副作用非常罕見。

我的子女仍能接受其他免疫注射嗎？

可以。Synagis®不會干擾其他免疫注射。小孩可以同日接受疫苗。

如果我的子女感到不適，仍能接受Synagis®嗎？

一般均可以。如果子女感到非常不適，並發高燒，你便要帶她／他看醫生。醫生或要求小孩痊癒後才接受注射。但另一方面，醫生亦可能覺得拖延注射Synagis®對小孩構成更大風險。一般來說，輕微發燒或傷風，都不足以構成延遲注射的理由。

子女接受Synagis®後仍會感染呼吸道合胞病毒嗎？

可以，但嚴重不適以至需要入院治理的機會便可減低。家長須要知道，Synagis®不能預防其他病毒感染。

請緊記—子女在整個呼吸道合胞病毒高峰期，均需**按時**接受所有注射，才能獲得保障。

保障子女，每月安排他們接受Synagis注射。