

Thông Tin về Fentanyl Truyền Tĩnh Mạch

Information about Intravenous Fentanyl

www.bcwomens.ca

Fentanyl là gì?

Đây là một loại thuốc giảm đau mạnh (ma túy). Quý vị có thể được cho dùng thuốc này để giảm đau trong lúc lâm bồn. Một số phụ nữ cho biết thuốc này giúp họ bớt cơn đau dữ dội và chịu đựng dễ hơn. Thuốc này sẽ giảm phần lớn cơn đau nhưng không hết đau hoàn toàn. Liều lượng giúp giảm đau khi lâm bồn sẽ khiến quý vị buồn ngủ và giảm bớt khả năng hô hấp. Như vậy có thể nguy hiểm cho quý vị.

Thuốc này được cho dùng như thế nào?

Thuốc này được cho dùng theo cách an toàn cho quý vị và em bé.

- ▶ Trước hết y tá luồn một ống vào tay hoặc cánh tay của quý vị và cách này được gọi là tiêm tĩnh mạch hay IV.
- ▶ Y tá, bác sĩ, hoặc nhân viên hộ sinh truyền thuốc qua ống này hoặc quý vị có thể tự truyền lấy qua IV bằng cách kiểm soát một bơm tay. Bơm này được gọi là bơm do bệnh nhân điều khiển. Nếu quý vị dùng bơm, quý vị không thể tự bơm cho mình quá nhiều thuốc này vì bơm được định sẵn chỉ cho phép những liều lượng an toàn.

Các tác dụng phụ của Fentanyl

- ▶ Quý vị có thể buồn ngủ.
- ▶ Nhịp hô hấp chậm lại. Một số phụ nữ cần được cho thở dưỡng khí và theo dõi sát nếu xảy ra tình trạng này.
- ▶ Quý vị có thể cảm thấy đau bụng. Dùng Fentanyl ít xảy ra trường hợp hơn so với những loại ma túy khác.

Các tác dụng phụ tiếp theo...

- ▶ Fentanyl ngấm qua nhau thai vào em bé. Vì thế, em bé có thể buồn ngủ và không hô hấp mạnh khi sinh. Nếu xảy ra tình trạng này, em bé có thể được cho dùng một loại thuốc có tên là Naloxone. Naloxone được tiêm vào bắp thịt chân của em bé. Đôi khi, nếu quý vị cần nhiều fentanyl, nhịp hô hấp của em bé có thể phải được theo dõi sát trong nhiều giờ.
- ▶ Em bé có thể gặp phần nào khó khăn khi bắt đầu bú sữa mẹ vì buồn ngủ và quý vị có thể cần được giúp nhiều hơn để cho em bé bú sữa mẹ. Y tá và/hoặc tham vấn viên về sữa mẹ có thể giúp quý vị bắt đầu cho con bú sữa mẹ.

Thuốc này không làm được gì?

- ▶ Fentanyl sẽ không làm hết đau hoàn toàn.
- ▶ Fentanyl không làm giảm đau để bác sĩ/nhân viên hộ sinh có thể giúp đưa em bé ra bằng cách dùng kẹp hoặc hút ra.
- ▶ Nếu quý vị lâm bồn trong một thời gian lâu thì thuốc này có thể không giúp được nhiều sau này và quý vị có thể cần một loại thuốc giảm đau khác.